

MATERIAL NECESSÁRIO

 Papel absorvente (ex. papel de cozinha) e sacos de papel.

QUANTIDADES E PROCEDIMENTO DE COLHEITA

Cultura	Época de colheita	Órgãos ou parte da planta a colher	Nº de Plantas para compor a amostra
ABACATEIRO	Setembro/Outubro	Folhas completamente desenvolvidas, com 5-7 meses de idade, de ramos não frutíferos, colhendo 4 folhas por árvore, segundo os 4 pontos cardeais	15
ACTINÍDEA (KIWI)	Início do engrossamento dos frutos (meados Julho)	Folhas inteiras de ramos frutíferos do ano, a 1,70m do chão, colhendo 2 folhas por planta, anexas ao último fruto contado a partir da base de lançamento	15
	Antes da floração	Folha mais nova completamente desenvolvida	15
ALECRIM	Verão	Lançamentos terminais com 5 a 8 cm no verão	40
ALFACE	A meio do ciclo vegetativo	Folha intermédia completamente desenvolvida	20-30
ALFARROBEIRA	Novembro/Dezembro	Folhas inteiras colhidas no terço médio dos ramos	15-20
AMEIXEIRA	Meados da estação de crescimento (Julho/Agosto)	Folhas do terço médio dos ramos de crescimento do ano, inseridos à mesma altura da copa, colhendo 4-8 folhas por árvore, segundo os 4 pontos cardeais	15
AMENDOEIRA	Meados da estação de crescimento	Folhas do terço médio dos ramos de crescimento do ano, inseridos à mesma altura da copa, colhendo 4-8 folhas por árvore, segundo os pontos cardeais	15
AMORA	Início da floração	Folha mais nova completamente desenvolvida do ramo floral mais jovem	15
ARROZ	Máximo afilamento (a) Iniciação da panícula (b)	Folha mais nova completamente desenvolvida: (a) imediatamente antes do início do encanamento; (b) folha Y.	20
AVELEIRA	Meados da estação de crescimento (Julho/Agosto)	Par de folhas completamente desenvolvidas dos ramos de crescimento do ano, inseridos à mesma altura da copa, colhendo 4-8 folhas por árvore, segundo os 4 pontos cardeais	15
BATATA	Aos 30cm altura, a meio crescimento do tubérculo	Folha mais nova completamente desenvolvida	20-30
CEREJEIRA	Meados da estação de crescimento (Julho/Agosto)	Folhas inteiras do terço médio do lançamento do ano inseridos à mesma altura da copa, colhendo 4-8 folhas por árvore, segundo os 4 pontos cardeais	15
CIDREIRA	Pré-Floração	Folha mais nova completamente desenvolvida imediatamente antes do corte comercial	20-30
CITRINOS	Setembro/Outubro	Folhas inteiras, com 4-7 meses de idade, de ramos não frutíferos de rebentação da Primavera, inseridos à mesma altura da copa, colhendo 4-8 folhas inteiras por árvore, segundo os 4 pontos cardeais	15
DAMASQUEIRO	Julho/Agosto	Folhas do terço médio dos lançamentos do ano colhidas a meio da estação	15-20



DIOSPIREIRO	Agosto/Setembro	Folhas mais novas completamente desenvolvidas de ramos do ano, não frutíferos, colhidas cerca de dois meses antes da colheita.	15
ESPARGO	Agosto/Setembro	50 cm da parte superior dos rebentos	12-15
FIGUEIRA	Meados da estação de crescimento (Julho/Agosto)	Folhas completamente desenvolvidas, do terço médio do lançamento do ano, de ramos não frutíferos, colhendo 1-2 folhas por árvore, segundo os 4 pontos cardeais	15
FIGUEIRA-DA-ÍNDIA	Fim do Inverno	Cladódios terminais no início do desenvolvimento vegetativo	15
FRAMBOESA	Início da floração	Folha mais nova completamente desenvolvida do ramo floral mais jovem	15
GINJEIRA	Julho/Agosto	Folhas do terço médio dos lançamentos do ano colhidas a meio da estação.	20-30
LÚCIA-LIMA (LIMONETE)	Pré-Floração	Folha mais nova completamente desenvolvida imediatamente antes do corte comercial	30-40
MACIEIRA	90-120 dias	Folhas do terço médio dos lançamentos do ano, inseridos à mesma altura da copa, colhendo 4-8 folhas por árvore, 1 de cada lançamento, segundo os 4 pontos cardeais	15
MANGUEIRA	Antes da floração	Folhas colhidas no terço médio de ramos do ano bem expostos à luz	20-30
MARACUJAZEIRO	Verão	Folhas recém-adultas, de lançamentos laterais bem desenvolvidos, colhidas em 15 plantas, de um lado e de outro da linha, 4 a 5 folhas por planta	15-20
MEDRONHEIRO	Julho/Agosto	Folhas completamente desenvolvidas colhidas no terço médio dos lançamentos do ano	15-20
MELANCIA	Do início floração à frutificação	5ª folha mais nova completamente desenvolvida	12-15
MELÃO, MELOA	Do início floração à colheita	5ª folha mais nova completamente desenvolvida	12-15
MILHO	Fase anterior ao embandeiramento	Folha mais nova completamente desenvolvida	15-20
MIRTILO	Verão	Folha mais nova completamente desenvolvida do ramo floral mais jovem	75
MORANGUEIRO	À floração ou início frutificação	Folha mais nova completamente desenvolvida	30-40
NOGUEIRA	Meados da estação de crescimento (Julho/Agosto)	Par de folíolos da parte central do terço médio dos lançamentos do ano, inseridos à mesma altura da copa, colhidos em 4 folhas por árvore, segundo os 4 pontos cardeais	15
OLIVEIRA	Endurecimento do caroço (Julho/Agosto)	Folhas inteiras e sãs do terço médio dos lançamentos da Primavera anterior, inseridos à mesma altura da copa, colhendo 4-8 folhas por árvore, 1 de cada lançamento, segundo os 4 pontos cardeais	30-40
PEPINO	Do início da floração à colheita	5ª folha mais nova completamente desenvolvida	12-15
PESSEGUEIRO	Julho/Agosto	Folhas do terço médio dos ramos de crescimento do ano, inseridos à mesma altura da copa, colhendo 4-8 folhas por árvore, segundo os 4 pontos cardeais	15
PEREIRA	100 - 110 dias após plena floração	Folhas do terço médio dos lançamentos do ano, inseridos à mesma altura da copa, colhendo 4-8 folhas por árvore, 1 de cada lançamento, segundo os 4 pontos cardeais	15
PISTACEIRA	1 mês antes da colheita	Folíolos terminais de folhas localizadas na parte central dos lançamentos de ramos não frutíferos	20-30



PINHEIRO-MANSO	Repouso Invernal (Dezembro/Fevereiro)	Agulhas situadas no terço médio dos lançamentos laterais dos raminhos localizados na base da metade superior da copa e na zona exposta ao sol	50
PIMENTO	Da 1ª floração ao 1/3 da floração final	Folha mais nova completamente desenvolvida	25-30
ROMÃZEIRA	Meados de Julho/Agosto	Folhas da primavera anterior, de lançamentos sem frutificação terminal	20-30
ROSEIRA	Durante o período de produção	Folhas superiores, sem pecíolo, do caule floral	20-30
SALSA/OREGÃO/MANJERICÃO	Verão	Folha mais nova recentemente desenvolvida	30-40
SOBREIRO	Repouso Vegetativo (Dezembro/Fevereiro)	Folhas adultas completamente desenvolvidas, do terço médio dos crescimentos anuais, inseridos no terço médio da copa	20
TOMATEIRO	Na formação dos cachos florais	Folha mais nova completamente desenvolvida adjacente à inflorescência do topo	20-25
TRIGO, ARROZ, CEVADA, AVEIA, CENTEIO	Imediatamente antes do espigamento	As quatro folhas superiores	50-100
VIDEIRA	Plena floração	Folhas opostas ao cacho basal, com pecíolos, inseridas no terço médio do braço, colhendo 2 folhas por videira. Destacar os pecíolos ainda na vinha	40

TRANSPORTE E ENVIO DAS AMOSTRAS PARA ANÁLISE

Envolver os órgãos ou parte da planta colhida em papel absorvente (ex. papel de cozinha). A entrega das amostras deve ser feita até 24 horas depois da colheita. No caso de não ser possível a entrega no laboratório no próprio dia da colheita, deve colocar a amostra em refrigeração. A amostra também pode ser enviada por correio azul ou verde, numa embalagem adequada para dar entrada no laboratório no espaço de 24 horas.

NOTA: Deve ser SEMPRE preenchida a ficha de requisição e esta enviada juntamente com a amostra para que o laboratório possa dar seguimento ao processo.

